

آزميكسين

موسّع للقصبات - مقشع

التركيب:

كل ٥ مل من المحلول الفموي يحتوي على:
تريبولين سلفات ١,٢٥ ملغ
بروميكسين هيدروكلوريد ٤ ملغ
غوايفينيزين ٥٠ ملغ
منشول ٢,٥ ملغ

الخواص:

البروميكسين هيدروكلوريد: عامل حلال للبلغم (يقطّل من لزوجة إفرازات الشعب الهوائية)
الغوايفينيزين:

(مقشع - يخفف من احتقان الصدر والحنك، مما يسهل السعال من خلال الفم).
كبريتات التريبولين: موسعات الشعب الهوائية (يفتح الشعب الهوائية ويجعل التنفس أسهل).
الاستطبابات:

يستخدم للحالات التي يتواجد فيها الكثير من المخاط السميك في الشعب الهوائية.
ينتمي المستحضر إلى مجموعة من الأدوية تسمى حالات المخاط. يعمل المستحضر عن طريق تخفيف سماكة المخاط في الشعب الهوائية، مما يجعل المخاط أقل لزوجة ويسهل إزالته. المخاط. يقترح باستخدام هذا المستحضر للتخفيف السريع من السعال المرتبط بالتهاب الشعب الهوائية، الربو القصبي، انتفاخ الرئة وغيرهما من الاضطرابات الرئوية - القصصية حيث يتواجد بشكل مرافق تشنج قصبات، انسداد مخاطي ومشاكل في التفتّح.
يتم علاج السعال المرتبط بالتهاب القصصيات الحاد والمزمن، انتفاخ الرئة، التدخين الفعال والسليبي؛ السعال الرئوي وغيرهما من الاضطرابات الشعبوية التشنجية بواسطة البروميكسين، الغوايفينيزين، التريبولين والمينثول.

مضادات الاستطباب:

شراب البروميكسين، الغوايفينيزين، التريبولين والمينثول هو مضاد استطباب في حالة:
- فرط الحساسية المعروفة لأي مكون من مكونات الشراب.
- اضطراب نظم القلب.
- خلل الوظيفة الكبدية.
- قرحة في المعدة والاثني عشر.
- الميل للنزيف.
- الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، فترة الرضاعة.

التحذيرات:

لا يستخدم هذا المنتج من أجل:
- المرضى الذين يتناولون مضطبات مونو أمين أو أكسيداز (MAOI)، أدوية معينة للاكتئاب (الحالات النفسية أو العاطفية أو مرض باركنسون أو لمدة أسبوعين بعد إيقاف الأدوية المضطبة للمونو أمين أو أكسيداز).
- المرضى الذين يتناولون المركبات أو المهدئات.
- إيقاف الاستخدام وطلب مشورة الطبيب في حال:
حدوث عصبية، دوخة، أو أرق.
استمرار السعال أو احتقان الأنف لأكثر من أسبوع، أو ميله إلى التكرار، أو مصاحبته للحمى، الطفح أو الصداخ المستمر. قد يكون السعال المستمر علامة على وجود حالة خطيرة.
حدوث أعراض جديدة.

استال الطبيب قبل الاستخدام إذا كان لدى المريض:

- زرق.
- السعال الذي يدوم أو المزمّن كالذي يحدث مع الربو.
- مرض قلبي (ارتفاع ضغط الدم).
- مرض في الغدة الدرقية.
- مرض السكري.
- مشكلة في التنفس أو سعال مستمر أو مزمّن كالذي يحدث في حال التدخين أو الربو.
- انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمّن.
- سعال يرافقه البلغم المفرط (مخاط).
- صعوبة في التبول بسبب تضخم غدة البروستات.

الآثار الجانبية:

قد تحدث بعض التأثيرات الجانبية من حين لآخر مع البروميكسين وقد تم الإبلاغ عن ارتفاع عابر في قيم الأمينوتراسفيراز المصلية. تتضمن التأثيرات الجانبية الأخرى المبلغ عنها: الجهاز الهضمي: غثيان، إقياء، عسر الهضم، الإسهال، نادراً ما يؤدي إلى تفاقم القرحة المعوية.

نظام القلب والأوعية الدموية: الخفقان، تسرع القلب.
الجهاز العصبي المركزي والمحيطي: دوخة، صداع، رعاش، ونعاس.
يمكن الإبلاغ عن تفاعلات الحساسية بشكل نادر للغاية.

الحمل والإرضاع:

يجب استخدام الدواء بحذر أثناء الحمل.
هذا المنتج هو مضاد استطباب في الأشهر الثلاثة الأولى من فترة الحمل والإرضاع.

الجرعة وطريقة الإعطاء:

للبالغين والأطفال ١٢ سنة وما فوق: ملعقتان صغيرتان (١٠ كل) ٤ ساعات
الأطفال ٦ سنوات إلى أقل من ١٢ سنة: ملعقة صغيرة (٥ كل) ٤ ساعات
لا تتجاوز ٦ جرعات خلال ٢٤ ساعة.

شروط الحفظ:

يحفظ بدرجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية، بعيداً عن الحرارة
وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
التعبئة: عبوة زجاجية عاتمة سعة ١٠٠ مل

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعماله خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك، فالصيدلاني والطبيب هما الخياران بالدواء وينبغهم وضرمه.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالة العرب

أمين فارما

للتصناعات الدوائية - حلب - سوريا



Sy103-L

AZMEXEN

Bronchodilator - Expectorant

Composition:

Terbutaline Sulfate 1.25mg
Bromhexine Hydrochloride 4mg
Guaifenesin 50mg
Munthol 2.5mg

Properties:

Bromhexine Hydrochloride: Mucolytic Agent (reduces the viscosity of bronchial secretions).

Guaifenesin: Expectorant - (loosens congestion in chest and throat, making it easier to cough out through your mouth).

Terbutaline Sulphate: Bronchodilators (open airways and make breathing easier).

Indications:

used for conditions where there is a lot of thick mucus in the airways.

The product belongs to a group of medications called mucolytics. The product works by thinning the mucus in the airways, thus making the mucus less sticky and it also facilitates the removal of the mucus. The product is suggested for clinical relief of cough associated with bronchitis, bronchial asthma, emphysema and other bronchopulmonary disorders where bronchospasm, mucus plugging and problems of expectoration co-exist.

Cough associated with Acute and Chronic Bronchitis, Emphysema, Active and Passive Smoking, Pulmonary TB and other Bronchospastic Disorders are treated by- Bromhexine, Guaifenesin, Terbutaline and Menthol.

Contraindications:

Terbutaline, Guaifenesin, Bromhexine, Menthol Syrup is contraindicated with:

known hypersensitivity to any component of the syrup.

Cardiac rhythm disorder.

Disorder of hepatic function.

Peptic ulcer of stomach and duodenum.

Tendency to bleeding.

First trimester of pregnancy, lactation period.

Warnings:

Do not use this product to:

The patient who is taking a prescription monoamine oxidase inhibitor (MAOI), certain drugs for depression, psychiatric or emotional conditions or Parkinson's disease or for 2 weeks after stopping the MAOI drug.

Patients Taking sedatives or tranquilizers.

Stop use and ask a doctor if:

Nervousness, dizziness, or sleeplessness occur.

Cough or nasal congestion persists for more than 1 week, tends to recur, or is accompanied by a fever, rash or persistent headache. A persistent cough may be a sign of a serious condition.

New symptoms occur.

Ask a doctor before use if the patient has:

Glaucoma.

· A cough that lasts or is chronic such as occurs with asthma. Heart disease (high blood pressure).

Thyroid disease.

Diabetes.

· A breathing problem, or persistent or chronic cough such as occurs with smoking, asthma, Emphysema or chronic bronchitis.

Cough accompanied by excessive phlegm (mucus).
Difficulty in urination due to enlargement of the prostate gland.

Adverse Effects:

Few adverse effects may occur occasionally with Bromhexine and a transient rise in serum amino transferase value has been reported. Other reported adverse effects include:

Digestive system: nausea, vomiting, dyspepsia, diarrhea, very seldom exacerbation of peptic ulcer.

Cardiovascular system: palpitations, tachycardia.

Central and peripheral nervous system: dizziness, headache, tremor, drowsiness.

Allergic reactions can be reported extremely seldom.

Pregnancy and Lactation:

The drug is to be carefully used during pregnancy.

This product is contraindicated in first trimester of pregnancy and lactation period.

Posology and method of administration:

Adults and children 12 years and over: 2 teaspoonfuls (10ml) every 4 hours.

children 6 years to under 12 years :1 teaspoonful (5ml) every 4 hours.

Do not exceed 6 doses in a 24 hour period.

Storage conditions:

Store at a temperature below 25°C, away from heat and out of reach of children.

Packaging: Opaque glass bottle with a capacity of 100 ml.

THIS IS A MEDICAMENT

A medicament is a Product but Unlike any Other Products
A medicament is a Product Which Affects Your health, and its Consumption Contrary to Instructions is Dangerous for you.
Follow Strictly the Doctors' Prescription, the Method of use and the Instructions of the Pharmacist who Sold the Medicament. The Doctor and the Pharmacist are Experts in Medicine, its Benefits and Risks.
Do not by Yourself Interrupt the Period of Treatment Prescribed for you.
Do not Repeat the Same Prescription Without Consulting your Doctor.

Keep Medicaments out of Reach of children

(Council of Arab Health Ministers)

(Arab Pharmacists Association)



AMEEN PHARMA
Pharmaceutical Industry
Aleppo-Syria

Sy103-L