

التركيب والسواغات:

- كل ٥ مل من المحلول الفموي يحتوي على: ديفينهيدرامين هيدروكلوريد ١٢,٥ ملغ
الاستطبابات:

- ديفينهيدرامين هو مضاد للهستامين يستخدم لتخفيف أعراض الحساسية، السعال الجاف المتقطع، حمى القش (التهاب الأنف التحسسي) ونزلات البرد.
- أيضاً حكة العينين / الأنف / الحلق / سيلان الأنف، والعطس.

- كما أنه يستخدم لمنع وعلاج الغثيان، القيء، العلاج والوقاية من دواء الحركة.

الفعل الفارماكولوجي:

- ديفينهيدرامين هيدروكلوريد هو مضاد للهستامين مع مضاد للكولين (مجفف) وتأثيرات مهدنة.
- يبدو أن مضادات الهستامين تتنافس مع الهستامين في مواقع مستقبلات الخلايا على الخلايا المستجيبة.

التحذيرات:

- لا يوصف مع أدوية أخرى للسعال تحتوي على مكونات مماثلة.

الجرعة / الشرب:

٦,٢٥ ملغ (٦ سنوات إلى أقل من ١٢ سنة):
٢ ملعقة صغيرة كل ٤ ساعات حسب الحاجة
(الحد الأقصى ٦٠ مل/يوم)
١٢,٥ ملغ (للأطفال من ٦ إلى ١١ سنة) ٥ مل إلى ١٠ مل
- يؤخذ كل ٤-٦ ساعات
- لا تستخدم أكثر من ٦ مرات خلال ٢٤ ساعة

أمبول بلاستيكي معد للشرب:

١- ٢ أمبولة بلاستيكية (٥ مل لكل منهما) كل ٤-٦ ساعات.
لا تتجاوز ١٢ أمبولة بلاستيكية خلال ٢٤ ساعة.
الأطفال أقل من ٦ سنوات: مضاد استطباب.

الآثار الجانبية:

النعاس، الدوار، الإمساك، اضطراب في المعدة، عدم وضوح الرؤية، جفاف الفم / الأنف / الحلق.
نفسية / مزاجية (مثل القلق، الارتباك)، صعوبة التبول، سرعة وعدم انتظام ضربات القلب.

احتياطات:

- لا يستخدم للأطفال بعمر دون ٦ سنوات.

- لا تزيد مدة العلاج عن ٥ أيام.

- لا يستخدم عند حدوث تحسس للديفينهيدرامين أو أي من مكونات الصيغة.

- تجنب تناول المشروبات الكحولية.

- قبل استخدام هذا الدواء، إخبار الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبي، خاصة في حال وجود مشاكل في التنفس مثل الربو، الضغط العالي في العين (الغلوكوما) مشاكل القلب، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الكبد، النوبات الصرعية، مشاكل المعدة / الأمعاء (مثل القرحة، انسداد فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط الدرقية) صعوبة التبول.

خلال فترة الحمل:

يجب استخدام هذا الدواء فقط عند الحاجة الشديدة.
- يمر هذا الدواء إلى حليب المرضعة وقد يكون له تأثيرات غير مرغوبة على الطفل الرضيع.

التداخلات الدوائية:

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منتجات أخرى تسبب النعاس مثل مسكنات الألم الأفيونية أو مسكنات السعال (مثل الكودين، هيدروكودون) الكحول وعقاقير النوم أو القلق (مثل البرازولام، لورازيبام، الزولبيديم) المرخيات العضلية (مثل كاريزوبريدول، سيكلوبنزابرين) أو مضادات الهستامين الأخرى (مثل السيتريزين، الكلورفينيرامين).

قد يتداخل هذا الدواء مع بعض الاختبارات المخبرية (بما في ذلك اختبار حساسية الجلد)، مما قد يتسبب بنتائج اختبار خاطئة.

فرط الجرعة: أعراض الجرعة الزائدة يمكن أن تشمل:

النعاس الشديد، نوبات صرعية، واتساع الحدقة.
- **عند الأطفال:** قد تحدث قبل النعاس تغيرات نفسية مزاجية (مثل التملل، التهيج، والهلوسة).
عند نسيان الجرعة: تؤخذ حالما يتم تذكرها.
- إذا كانت قريبة من وقت الجرعة التالية تخطى الجرعة المنسية وتابع جدول الجرعات المعتاد.
- لا تضاعف الجرعة.

شروط الحفظ: يحفظ بدرجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ درجة مئوية بعيداً عن الضوء والحرارة وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

التعبئة: عبوة زجاجية عاتمة سعة ١٠٠ مل

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعماله خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك، فالصيدلاني والطبيب هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- لا تقطع مدة العلاج المحدودة من تلقاء نفسك

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالة العرب



Calmistin

Oral Solution

Composition and Excipients:

Each 5ml of oral solution contains:

Diphenhydramine HCL 12.5mg

Uses:

Diphenhydramine is an antihistamine used to relieve symptoms of allergy, hacking cough, hay fever and the common cold.

Also itchy eyes/nose/throat, runny nose, and sneezing.

- it is also used to Prevent and treat nausea, vomiting.

For active and prophylactic treatment of motion sickness.

Pharmacological Action:

Diphenhydramine hydrochloride is an antihistamine with anticholinergic (drying) and sedative effects. Antihistamines appear to compete with histamine for cell receptor sites on effectors cells.

Warnings:

Do not prescribe other cough-and-cold medications that contain the same ingredients.

Dosage/Syrup:

6.25 mg (6 years to under 12 years):

2 teaspoons every 4 hours as needed.

Maximum level 60 ml/day.

12.5 mg (children 6 to 11 years) 5 ml to 10 ml

- Take every 4-6 hours

- Do not use more than 6 times in 24 hours

Oral Plastic Ampoule:

1-2 oral plastic ampoule (5 ml each) every 4-6 hours. Do not exceed 12 plastic ampoule in 24 hours.

Children under 6 years: contraindication.

Side Effects:

Drowsiness, dizziness, constipation, stomach, upset, blurred vision, or dry mouth/nose/throat.

Mental/mood changes (such as restlessness, confusion), difficulty urinating, fast/irregular heartbeat.

Contraindications:

Do not use this product in children below 6 years.

Treatment period must not exceed 5 days.

Allergy to Diphenhydramine or any other

material in the formula.

Avoid alcohol beverages.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: breathing problems such as asthma, high pressure in the eye (glaucoma) heart problems, high blood pressure, liver disease, seizures, stomach/intestine problems (such as ulcers, blockage) overactive thyroid (hyperthyroidism) urinating difficulty.

During pregnancy, this medication should be used only when clearly needed.

This drug passes into breast milk and may have undesirable effects on a nursing infant.

Drug Interactions:

Tell your doctor or pharmacist if you are taking other products that cause drowsiness such as opioid pain or cough relievers (such as codeine, hydrocodone) alcohol, drugs for sleep or anxiety (such as alprazolam, lorazepam, zolpidem) muscle relaxants (such as carisoprodol, cyclobenzaprine) or other antihistamines (such as cetirizine, chlorpheniramine).

This medication may interfere with certain laboratory tests (including allergy skin test) possibly causing false test results.

Overdose:

Symptoms of overdose may include: severe drowsiness, seizures, widened pupils. in children, mental/mood changes (such as restlessness, irritability, hallucinations) may occur before drowsiness.

If you miss a dose, take it as soon as you remember. If it is near the time of your next dose, skip the missed dose. Take your next dose at the regular time. Do not double the dose.

Storage Conditions:

Store at a temperature not exceeding 25°C, away from light and heat, and out of reach of children.

Packaging:

Opaque glass bottle with a capacity of 100 ml.

THIS IS A MEDICAMENT

- A medicament is a Product but Unlike any Other Products
- A medicament is a Product Which Affects Your health, and its Consumption Contrary to Instructions is Dangerous for you.
- Follow Strictly the Doctors Prescription, the Method of use and the Instructions of the Pharmacist who Sold the Medicament. The Doctor and the Pharmacist are Experts in Medicine, its Benefits and Risks.
- Do not by Yourself Interrupt the Period of Treatment Prescribed for you.
- Do not Repeat the Same Prescription Without Consulting your Doctor.

Keep Medicaments out of Reach of children

(Caucil of Arab Health Ministers)

(Arab Pharmacists Association)



AMEEN PHARMA
Pharmaceutical Industry
Aleppo-Syria

Sy601-L