

# ديكساميثازون - أمين

## الإيكسبر

التركيب:

كل ٥ مل من الإليكسير تحتوي على ٠,٥ ملغ

ديكساميثازون.

السواغات:

غليسرين، كحول إيثيلي، حمض البنزويك، نكهة الفواكه، صوديوم سكرين، تارترازين.

الخصائص:

ينتمي الديكساميثازون إلى زمرة الكورتيكوستيرويدات ويملك تأثيراً مضاداً للالتهاب ومضاداً للحساسية.

الاستطبابات:

يوصف ديكساميثازون لمعالجة مجال واسع من الاضطرابات بما فيها الحالات التحسسية والرماتيزمية، أمراض الجلد، أمراض العين، اضطرابات الغدد الصم، الأمراض التنفسية، اضطرابات الدم وبعض الحالات الأخرى، خاصة في العلاج المكثف خلال فترة قصيرة.

مضادات الاستطباب:

الالتهابات الفطرية، استعمال اللقاحات ذات الفيروسات الحية، يزداد تأثير الكورتيكوستيرويدات عند استعمالها لدى المرضى المصابين بنقص إفراز الدرق وتشمع الكبد.

التأثيرات الجانبية:

تؤدي الكورتيكوستيرويدات إلى عدد من التأثيرات الجانبية والتي تشمل اضطرابات السوائل والشوارد مثل احتباس الأملاح والماء. يمكن أن تحدث تأثيرات قلبية وعائية، عضلية هيكلية، معدية معوية، جلدية، غدية، عينية واستقلابية، كما يمكن أن يحدث انصمام خثاري.

يمكن للكورتيكوستيرويدات أن تنشيط الزحار الكامن كما تخفي أو تنشيط اللانثانات.

الاستعمال المديد يمكن أن يتبب بالإصابة بالزرق مع احتمال تخرب العصب البصري.

التحذيرات:

يستعمل بحذر لدى المصابين بأميالي:

- حساسية لأي دواء الذين ظهرت لديهم تفاعلات تاق سابقة، التهاب كولون قرحي غير نوعي، التهاب الرئج، مفاعرة معوية حديثة العهد، قرحة هضمية، قصور كلوي، ارتفاع ضغط، هشاشة عظام، أمراض انتانية، وهن عضلي وبيل، الحلا البسيط العيني، القابلية للأمراض النفسية وفي العلاج المديد خاصة الرضع والأطفال).

عندما تطول فترة العلاج يجب إعطاء المرضى المصابين سابقاً بالسسل وقاية كيميائية.

التداخلات الدوائية:

يستعمل بحذر عند المشاركة مع استيل ساليسيليك أسيد ومضادات التخثر.

يمكن أن يحدث قلة بوتاسيومية خاصة لدى المرضى الذين يتناولون مرات غير حاسبة للبوتاسيوم.

يزيد الفينيتوين والفينوباربيتال والإفيدرين والبريفامين التصفية الاستقلابية للكورتيكوستيرويدات.

الحمل والإرضاع:

يجب على الحامل والمرضع أن لا تستعمل الدواء قبل استشارة الطبيب.

قطع الدواء:

قد يحدث قصور قشري كطري نتيجة قطع الدواء فوراً.

يجب خفض أو إيقاف الجرعة تدريجياً وخلال عدة أيام.

الجرعة والاستعمال:

تحدد الجرعة تبعاً لحالة المريض والمرض المعالج (٠,٥-١٥ ملغ/اليوم).

الوزمة الدماغية:

٣ ملغ / مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

المتلازمة الكظرية المنشأ: ٠,٥-١,٥ ملغ/يوم.

في الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى معالجة طويلة الأمد، تستعمل الجرعة الدنيا التي تؤدي إلى تحسن كاف.

الحفظ: يحفظ في درجة حرارة ما بين ١٥-٣٠ درجة مئوية، بعيداً عن الضوء والحرارة وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

التعبئة: عبوة زجاجية سعة ١٠٠ مل.

### إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعماله خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك، فالصيدلاني والطبيب هما الخبيران بالدواء وينفعه وضربه.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب

أمين فارما

للصناعات الدوائية - حلب - سوريا



# Dexamethasone - ameen

## Elixir

### Composition:

Each 5ml Elixir contains 0.5mg dexamethasone.

### Excipients:

Glycerin, Alcohol Ethyl, Benzoic Acid, Fruit Flavour, Saccharine Sodium, Tartrazine.

### Properties:

Dexamethasone Belongs to a Class of Drugs Known as Corticosteroids, it has an anti-inflammatory and an anti-allergic action.

### Indications:

Dexamethasone is prescribed for a wide range of disorders including allergic conditions, rheumatic conditions, skin diseases, eye diseases, endocrine disorders, respiratory diseases, blood disorders, and some others, especially for intensive treatment during shorter periods.

### Contraindications:

Systemic fungal infections, administration of live virus vaccines.

There is an enhanced effect of corticosteroids in patients with hypothyroidism and in those with cirrhosis.

### Side Effects:

Corticosteroids can cause a number of side effects which include fluid and electrolyte disturbances like salt and water retention.

Cardiovascular, musculo-skeletal, gastrointestinal, dermatological, endocrine, ophthalmic and metabolic effects and thromboembolism may occur.

Corticosteroids may activate latent amebiasis, and may mask or enhance infections.

Prolonged use may produce glaucoma with possible damage to optic nerve.

### Precautions:

Use with caution in patients with the following:  
a history of allergies to any drug, anaphylactic reactions have occurred, nonspecific ulcerative colitis, diverticulitis, recent intestinal anastomoses, peptic ulcers, renal insufficiency, hypertension, osteoporosis, infectious diseases, myasthenia gravis, ocular herpes simplex, psychotic tendencies and in prolonged therapy (especially in infants and children).

When corticosteroid therapy is prolonged, patients with previous tubercular infections should receive chemoprophylaxis.

### Drug Interactions:

Use with caution in conjunction with acetylsalicylic acid and anticoagulants.

Hypokalemia may occur especially in patients receiving potassium-depleting diuretics.

Phenytoin, phenobarbital, ephedrine and rifampin may enhance the metabolic clearance of corticosteroids.

### Pregnancy & Nursing Mothers:

Pregnant and nursing mothers should consult their physician.

### Withdrawal Of The Drug:

Secondary adrenocortical insufficiency may result from the abrupt withdrawal of corticosteroids. Dosage should be decreased or discontinued gradually after several days.

### Dosage & Administration:

Depending on the conditions of the patient and the disease being treated: (0.5-15 mg/day).

Cerebral edema: 2 mg two or three times a day. Adrenogenital syndrome:

usually 0.5-1.5 mg/day.

In chronic conditions requiring long-term therapy, use the lowest dosage that provides adequate relief.

### Storage:

Keep at a temperature between 15 - 30°C, away from light and heat, and out of reach of children.

### Packing:

Elixir : Bottle of 100 ml.

### THIS IS A MEDICAMENT

- A medicament is a Product but Unlike any Other Products
- A medicament is a Product Which Affects Your health, and its Consumption Contrary to Instructions is Dangerous for you.
- Follow Strictly the Doctors' Prescription, the Method of use and the Instructions of the Pharmacist who Sold the Medicament.
- The Doctor and the Pharmacist are Experts in Medicine, its Benefits and Risks.
- Do not by Yourself Interrupt the Period of Treatment Prescribed for you.
- Do not Repeat the Same Prescription Without Consulting your Doctor.

Keep Medicaments out of Reach of children  
(Council of Arab Health Ministers) (Arab Pharmacists Association)



**AMEEN PHARMA**  
Pharmaceutical Industry  
Aleppo-Syria

EL401-L