

ميكونازول-أمين

كريم جلدي

5- يجب طلب المساعدة الطبية في حال تم ابتلاعه.

التداخلات الدوائية:

- من غير المحتمل أن يمتص الميكونازول عبر الجلد بكميات تكفي لتؤثر بشكل كبير مع الأدوية الأخرى التي تؤخذ عن طريق الفم.
- في حال تناوله مع الوراфарين فهناك احتمال قليل جداً أن يعزز الميكونازول امتصاص الكريم تأثير الوراфарين.
- ينصح في حال استخدامه مع أدوية موضعية أخرى أو مع مرطبات تطبيق على مساحة الجلد ذاتها بالمابعدة ٣٠ دقيقة بين تطبيق كلٍ من المستحضرين.

الجرعة وطريقة الإعطاء:

- تفسل المنطقة المصابة وتجفف جيداً.
- تطبق طبقة رقيقة على المنطقة المصابة مرتين باليوم (صباحاً ومساءً) أو حسب إرشادات الطبيب .
- يجب الإشراف على الأطفال خلال استعمال هذا الدواء.
- من أجل القدم الرياضية : يجب العناية بشكل خاص بالأماكن بين الأصابع وإرتداء حذاء ملائم، وأن تتم تهوية الأحذية وتغيير الحذاء و الجوارب مرة باليوم على الأقل.
- يستعمل يومياً لمدة ٤ أسابيع من أجل القدم الرياضية والقوباء الحلقية، كما يستعمل يومياً لمدة أسبوعين من أجل الحكة الناجمة عن سعة الأرفاغ .
- يجب استشارة الطبيب إذا استمرت الحالة لمدة أطول.
- هذا المستحضر غير فعال على فروة الرأس أو الأظافر.

شروط الحفظ:

- يحفظ بدرجة حرارة بين ٢٠ - ٢٥ درجة مئوية،
- يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

التعبئة:

عبوة كرتونية تحتوي تيوب سعة ٣٠ غرام.

التركيب الكيميائي:

كل ١ غ كريم يحتوي ٢٠ مغ من نترات الميكونازول.

الزمرة الدوائية: مضاد فطور .

آلية العمل:

- يقتل الميكونازول الفطور والخمائر من خلال التدخل على مستوى غشاء الخلية .
- يعمل من خلال إيقاف الفطر عن إنتاج مادة تدعى الإرغوستيرول، الذي هو عبارة عن مادة أساسية في تركيب الغشاء الخلوي للفطور.
- هذا التفاوت في إنتاج الإرغوستيرول يسبب تفاوت في تركيب الغشاء مما يجعل هنالك ثقبو ضمن الغشاء و غشاء الخلية الفطرية أساسي في بقائها على قيد الحياة.

الاستطبابات:

- معالجة معظم حالات القدم الرياضية، الحكة الناتجة عن سعة الأرفاغ والقوباء الحلقية.
- يخفف من الحكة، الحرق، التقرح والشعور بعدم الراحة المترافق مع هذه الحالات.

مضادات الاستطباب:

- عند المرضى الذين لديهم فرط حساسية تجاه المادة الفعالة أو أحد السواغات .
- عند المرضى الذين لم يتم تشخيص إبتان خميرة مهبل سابق لديهم من قبل الطبيب.

آثار جانبية:

- غير شائعة: تهيج الجلد (الإحساس بالحرق، إحمرار ، دفا، حكة) في مكان التطبيق

الحمل والإرضاع:

- يجب أن يستخدم هذا الدواء بحذر خلال الحمل، فقط عندما تكون الفائدة المرجوة منه لأم تفوق أي خطر محتمل على تطور الجنين.
- يجب طلب المساعدة الطبية من الطبيب قبل استخدام الدواء في حال الحمل.
- يجب استخدامه بحذر من قبل الأمهات المرضعات فقط إذا كانت الفائدة المرجوة منه لأم أكبر من الخطر المحتمل على الرضيع. كما يجب طلب المساعدة الطبية من الطبيب قبل استخدام الدواء في حالة الإرضاع . و في حال تم استخدام الكريم خلال الإرضاع يجب ألا يطبق على جلد الثديين بفترة قصيرة قبل الإرضاع لتجنب ابتلاعه من قبل الرضيع.

تحذيرات:

- 1- تجنب استعماله عند الأطفال تحت عمر السنتين إلا بنصيحة وإشراف الطبيب.
- 2- للاستعمال الخارجي فقط.
- 3- تجنب تماس هذا الدواء مع العينين.
- 4- يجب إيقاف استعمال هذا الدواء واستشارة الطبيب في حال: حدوث تخرش.
- لم يحدث تحسن خلال ٤ أسابيع (لأجل القدم الرياضية والقوباء الحلقية) أو أسبوعين (لأجل الحكة الناجمة عن سعة الأرفاغ).
- تجنب استعماله لطع الحفاض.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعمله خلافاً لتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك، فالصيدلاني والطبيب هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من لقاء نفسك.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالة العرب

أمين فارما

للصناعات الدوائية حلب - سوريا



Miconazole-Ameen

Dermal Cream

CHEMICAL COMPOSITION:

-Each 1g contains 20 mg MICONAZOLE NITRATE
PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION: Antifungal

MECHANISM OF ACTION:

- Miconazole kills fungi and yeasts by interfering with their cell membranes. It works by stopping the fungi from producing a substance called ergosterol, which is an essential component of fungal cell membranes.
 - The disruption in production of ergosterol disrupts the fungal cell membrane, causing holes to appear in it.
- The cell membranes of fungi are vital for their survival.

INDICATIONS:

- Treatment of most athlete's foot, jock itch, and ringworm.
- Relieves itching, burning, cracking, scaling and discomfort which accompany these conditions.

Contraindications:

- In patient has hypersensitivity to the active ingredient or to the excipients.
- In patients who never had a vaginal yeast infection diagnosed by a doctor.

SIDE EFFECTS:

- Uncommon: Skin irritation (e.g. burning sensation, redness, warmth, itching) at the application site.

PREGNANCY AND BREASTFEEDING:

- This medicine should be used with caution during pregnancy, and only if the expected benefit to the mother is greater than any possible risk to the developing baby.
- you should seek medical advice from your doctor before using this medicine if you are pregnant.
- It should be used with caution by Breastfeeding mothers, and only if the expected benefit to the mother is greater than any possible risk to the baby.
- you should seek medical advice from your doctor before using this medicine if you are breastfeeding.
- If you do use the cream while breastfeeding, you should not apply it to the skin of the breasts shortly before giving a feed, to avoid it being ingested by the nursing infant

WARNINGS:

1. Do not use on children under 2 years of age except under the advice and supervision of a doctor.
2. For external use only.
3. When using this product avoid contact with eyes.
4. Stop using this product and ask a doctor

- irritation occurs
- there is no improvement within 4 weeks (for athlete's foot and ringworm) or 2 weeks (for jock itch).
- do not use for diaper rash
- 5. If swallowed, get medical help

Drug Interactions:

- Miconazole is unlikely to be absorbed through the skin in sufficient amounts to significantly affect other medicines that you are taking by mouth.
- if you are taking warfarin, there is a very small chance that miconazole absorbed from this cream may enhance the effect of the warfarin.
- If you are using other topical medicines or moisturisers on the same area of skin it is recommended that you leave about 30 minutes between applying each product.

DOSAGE & ADMINISTRATION:

- wash affected area and dry thoroughly
- Apply a thin layer over affected area twice daily (morning and night) or as directed by a doctor.
- supervise children in the use of this product
- for athlete's foot, pay special attention to spaces between the toes, wear well-fitting, ventilated shoes and change shoes and socks at least once a day, for athlete's foot and ringworm use daily for 4 weeks, for jock itch use daily for 2 weeks.
- if conditions persist longer, ask a doctor.
- This product is not effective on the scalp or nails.

Storage conditions:

- Store at a Temperature Between (20-25°C)
- Do not Leave the Medicine Within reach of Children.

Packaging:

- a cardboard box containing a 30-gram tube.

THIS IS A MEDICAMENT

- A Medicament is a Product but Unlike any Other Products
- A Medicament is a Product Which Affects Your health, and its Consumption Contrary to Instructions is Dangerous for you.
- Follow Strictly the Doctors Prescription, the Method of use and the Instructions of the Pharmacist who Sold the Medicament.
- The Doctor and the Pharmacist are Experts in Medicine, its Benefits and Risks.
- Do not by Yourself Interrupt the Period of Treatment Prescribed for you.
- Do not Repeat the Same Prescription Without Consulting your Doctor.

Keep Medicaments out of Reach of children

(Council of Arab Health Ministers)

(Arab Pharmacists Association)



AMEEN PHARMA
Pharmaceutical Industry
Aleppo-Syria

PM 2602